

	Sleeve-leikkaus	Ohitusleikkaus	Mini-ohitusleikkaus
<b>Varhaiset (0-30 päivää)</b>			
Kiireelliset uusintaleikkaukset	1%	1%	1,3%
Suolen tai mahalaukun leikkaushaavojen vuotaminen	0,8%	0,7%	1%
Verenvuoto	1%	1%	1%
Suolitukos	0,8%	0,9%	0,16%
Syvä laskimotukos / keuhkoveritulppa	0,1%	0,1%	0,1%
Kuolema 90 päivän kuluessa leikkauksesta	0,02-0,05%	0,02-0,05%	0,02-0,05%
<b>Myöhäiset (30 päivää-5 vuotta)</b>			
Maha-/ohutsuolihaava	0,9%	1,7%	1%-2,8%
Mesenteriaalinen tyrä (sisäinen tyrä suolitukoksella tai vatsakivulla), joka saattaa vaatia uusintaleikkauksen	0%	4,7%	0%
Vaikea refluksi ja sen aiheuttama uusintaleikkaus	6-9%	0%	0,5-2%
Vajaaravitsemus	0,5%	0,5%	0,5-1,1%
Vaikea raudanpuuteanemia (suonensisäinen rautahoito)	2,8%	3,2%	1,25%
Vaikea Dumping-oireyhtymä	0%	2,5-3%	0,5%